

PROJE ÖNERİSİ

DÜŞÜK RİSKLİ MESANE KANSERİNDE POSTOPERATİF FARKLI MESANE İÇİ UYGULAMALARININ ONKOLOJİK TAKİP SONUÇLARINA ETKİSİ GÖZLEMSEL ÇALIŞMA

Levent TÜRKERİ & İlker TİNAY

ÜROONKOLOJİ
DERNEĞİ - 1999





HASTA GRUBU

- ilk kez tanı alan
 - düşük/orta riskli kasa invaze olmayan mesane kanseri hastaları
 - postoperatif erken dönemde mesane içine kemoterapi uygulanan
 - ya da sadece devamlı mesane irrigasyonu ile takip edilen hastalar
 - ya da kemoterapi verilmemiş ve devamlı mesane irrigasyonu uygulanmamış hastalar
-



HASTA GRUBU – Dahil edilme kriterleri

- ✓ Hasta bilgilendirilmiş onam formunun imzalatılması
 - ✓ > 18 yaş
 - ✓ ilk kez mesane kitlesi saptanan
 - ✓ Boyut < 3 cm
 - ✓ komplet örnekleme/rezeksiyon
 - ✓ Eksizyon materyalinde **kas varlığı gerekli değil**
-



HASTA GRUBU – Hariç bırakılma kriterleri

- İnkomplet örnekleme / rezeksiyon
 - Patoloji sonucu ürotelyal karsinom dışı
 - pTa'dan daha invaze tümör
 - Yüksek dereceli patoloji
 - Karsinoma in situ eşlik etmesi
 - Daha önce başka pelvik kanser tanı ve tedavi öyküsü
 - Başka bir organa ait aktif kanser tedavisi / takibi varlığı
 - Gebelik varlığı
-



MESANE İÇİ UYGULAMALAR

KEMOTERAPİ AJANLARI

Postoperatif ilk 24 st içinde

- Mitomisin (40 mg/ 100 ml – 2 saat)
- Epirubicin (50 mg/ 100 ml – 2 saat)
- Gemstabin (2 g/ 100 ml – 2 saat)

DEVAMLİ İRRİGASYON

Postoperatif dönemde > 6 saat süreyle

- Serum fizyolojik
-



MESANE KİTLESİNİN ÖRNEKLENMESİ

Katkıda bulunan merkezin rutin pratięi kabul edilecektir:

- ✓ Kullanılan Teknik (standart TUR, en-bloc örnekleme)
 - ✓ Kullanılan enerji kaynaęı (monopolar, bipolar, laser)
 - ✓ Kullanılan cihaz (rezeksiyon loop, cold punch)
-



HASTA TAKİBİ

- EAU Rehberleri önerisi olan:
 - **3. ay** kontrol sistoskopisi
 - 3. aydaki sistoskopisi temiz olan hastalarda **12. ay** kontrol sistoskopisi
 - İlk sene takipleri temiz olan hastalarda **5. yıla kadar** senelik kontrol sistoskopisi
 - ± Senelik üriner sistem ultrasonografisi
-



SONLANIM NOKTALARI

- i. Birincil sonlanım noktası – **İlk nükse kadar geçen süre**
 - ii. İkincil sonlanım noktaları:
 - **12. ay nüks oranı**
 - Takiplerde **progresyon (derece ve/ veya T evresi)** oranı
 - Postoperatif ilk 30 gün komplikasyon oranları
 - Hastanede kalış süresi
-